

# 饲料药物添加剂使用规范

发布日期：2009-06-09

中华人民共和国农业部公告第 168 号

为加强兽药的使用管理，进一步规范和指导饲料药物添加剂的合理使用，防止滥用饲料药物添加剂，根据《兽药管理条例》的规定，我部制定了《饲料药物添加剂使用规范》（以下简称《规范》），现就有关问题公告如下：

一、农业部批准的具有预防动物疾病、促进动物生长作用，可在饲料中长时间添加使用的饲料药物添加剂（品种收载于《规范》附录一中），其产品批准文号须用“药添字”。生产含有《规范》附录一所列品种成份的饲料，必须在产品标签中标明所含兽药成份的名称、含量、适用范围、停药期规定及注意事项等。

二、凡农业部批准的用于防治动物疾病，并规定疗程，仅是通过混饲给药的饲料药物添加剂（包括预混剂或散剂，品种收载于《规范》附录二中），其产品批准文号须用“兽药字”，各畜禽养殖场及养殖户须凭兽医处方购买、使用，所有商品饲料中不得添加《规范》附录二中所列的兽药成份。

三、除本《规范》收载品种及农业部今后批准允许添加到饲料中使用的饲料药物添加剂外，任何其它兽药产品一律不得添加到饲料中使用。

四、兽用原料药不得直接加入饲料中使用，必须制成预混剂后方可添加到饲料中。

五、各地兽药管理部门要对照本《规范》于 10 月底前完成本辖区饲料药物添加剂产品批准文号的清理整顿工作，印有原批准文号的产品标签、包装可使用至 2001 年 12 月底。

六、凡从事饲料药物添加剂生产、经营活动的，必须履行有关的兽药报批手续，并接受各级兽药管理部门的管理和质量监督，违者按照兽药管理法规进行处理。

七、本《规范》自 2001 年 7 月 3 日起执行。原我部《关于发布（允许作饲料药物添加剂的兽药品种及使用规定）的通知》（农牧发[1997]8 号）和《关于发布“饲料药物添加剂允许使用品种目录”的通知》（农牧发[1994]7 号）同时废止。

附件：1：饲料药物添加剂使用规范

2：饲料药物添加剂附录一

3：饲料药物添加剂附录二

中华人民共和国农业部

二 00 一年九月四日

附件 1: 饲料药物添加剂使用规范

**二硝托胺预混剂**

Dinitolmide Premix

[有效成分] 二硝托胺

[含量规格] 每 1000g 中含二硝托胺 250g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于禽球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 3 天。

**马杜霉素铵预混剂**

Maduramicin Ammonium Premix

[有效成分] 马杜霉素铵

[含量规格] 每 1000g 中含马杜霉素 10g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；不得用于其他动物；在无球虫病时，含百万分之六以上马杜霉素铵盐的饲料对生长有明显抑制作用，也不改善饲料报酬；休药期 5 天。

[商品名称] 加福、抗球王

**尼卡巴嗪预混剂**

Nicarbazin Premix

[有效成分] 尼卡巴嗪

[含量规格] 每 1000g 中含尼卡巴嗪 200g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 100-125g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；高温季节慎用；休药期 4 天。

[商品名称] 杀球宁

**尼卡巴嗪、乙氧酰胺苯甲酯预混剂**

Nicarbazin and Ethopabate Premix

[有效成分] 尼卡巴嗪和乙氧酰胺苯甲酯

[含量规格] 每 1000g 中含尼卡巴嗪 250g 和乙氧酰胺苯甲酯 16g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期和种鸡禁用；高温季节慎用；休药期 9 天。

[商品名称] 球净

**甲基盐霉素预混剂**

Narasin Premix

[有效成分] 甲基盐霉素

[含量规格] 每 1000g 中含甲基盐霉素 100g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 600-800g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；马属动物禁用；禁止与泰妙菌素、竹桃霉素并用；防止与人眼接触；休药期 5 天。

[商品名称] 禽安

### 甲基盐霉素、尼卡巴嗪预混剂

Narasin and Nicarbazin Premix

[有效成分] 甲基盐霉素和尼卡巴嗪

[含量规格] 每 1000g 中含甲基盐霉素 80g 和尼卡巴嗪 80g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 310-560g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；马属动物忌用；禁止与泰妙菌素、竹桃霉素并用；高温季节慎用；休药期 5 天。

[商品名称] 猛安

### 拉沙洛西钠预混剂

Lasalocid Sodium Premix

[有效成分] 拉沙洛西钠

[含量规格] 每 1000g 中含拉沙洛西 150g 或 450g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加 75-125g (以有效成分计)。

[注意] 马属动物禁用；休药期 3 天。

[商品名称] 球安

### 氢溴酸常山酮预混剂

Halofuginone Hydrobromide Premix

[有效成分] 氢溴酸常山酮

[含量规格] 每 1000g 中含氢溴酸常山酮 6g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于防治鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 5 天。

[商品名称] 速丹

### 盐酸氯苯胍预混剂

Robenidine Hydrochloride Premix

[有效成分] 盐酸氯苯胍

[含量规格] 每 1000g 中含盐酸氯苯胍 100g。

[适用动物] 鸡、兔

[作用与用途] 用于鸡、兔球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品，鸡 300-600g，兔 1000-1500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用。休药期鸡 5 天，兔 7 天。

### 盐酸氨丙啉、乙氧酰胺苯甲酯预混剂

Amprolium Hydrochloride and Ethopabate Premix

[有效成分] 盐酸氨丙啉和乙氧酰胺苯甲酯

[含量规格] 每 1000g 中含盐酸氨丙啉 250g 和乙氧酰胺苯甲酯 16g。

[适用动物] 家禽

[作用与用途] 用于禽球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；每 1000kg 饲料中维生素 B<sub>1</sub> 大于 10g 时明显拮抗；休药期 3 天

[商品名称] 加强安保乐

### 盐酸氨丙啉、乙氧酰胺苯甲酯、磺胺喹噁啉预混剂

Amprolium Hydrochloride、Ethopabate and

Sulfaquinoxaline Premix

[有效成分] 盐酸氨丙啉、乙氧酰胺苯甲酯和磺胺喹噁啉

[含量规格] 每 1000g 中含盐酸氨丙啉 200g、乙氧酰胺苯甲酯 10g 和磺胺喹噁啉 120g。

[适用动物] 家禽

[作用与用途] 用于禽球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；每 1000kg 中维生素 B<sub>1</sub> 大于 10g 时明显拮抗；休药期 7 天。

[商品名称] 百球清

### 氯羟吡啶预混剂

Clopidol Premix

[有效成分] 氯羟吡啶

[含量规格] 每 1000g 中含氯羟吡啶 250g。

[适用动物] 家禽、兔

[作用与用途] 用于禽、兔球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品，鸡 500g，兔 800g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 5 天。

### 海南霉素钠预混剂

Hainanmycin Sodium Premix

[有效成分] 海南霉素钠

[含量规格] 每 1000g 中含海南霉素 10g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500-750g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 7 天。

### 赛杜霉素钠预混剂

Semduramicin Sodium Premix

[有效成分] 赛杜霉素钠

[含量规格] 每 1000kg 中含赛杜霉素 50g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 5 天。

[商品名称] 禽旺

### 地克珠利预混剂

Diclazuril Premix

[有效成分] 地克珠利

[含量规格] 每 1000g 中含地克珠利 2g 或 5g。

[适用动物] 畜禽

[作用与用途] 用于畜禽球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加 1g（以有效成分计）。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用。

### 复方硝基酚钠预混剂

Compound Sodium Nitrophenolate Premix

[有效成分] 邻硝基苯酚钠、对硝基苯酚钠、5-硝基愈创木酚钠、磷酸氢钙和硫酸镁

[含量规格] 每 1000g 中含邻硝基苯酚钠 0.6g、对硝基苯酚钠 0.9g、5-硝基愈创木酚钠 0.3g、磷酸氢钙 898.2g 和硫酸镁 100g。

[适用动物] 虾、蟹

[作用与用途] 主用于虾、蟹等甲壳类动物的促生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 5-10kg。

[注意] 休药期 7 天。

[商品名称] 爱多收

### 氨苯砷酸预混剂

Arsanilic Acid Premix

[有效成分] 氨苯砷酸

[含量规格] 每 1000g 中含氨苯砷酸 100g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于促进猪、鸡生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 1000g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 5 天

### 洛克沙肿预混剂

Arsanilic Acid Premix

[有效成分] 洛克沙肿

[含量规格] 每 1000g 中含洛克沙肿 50g 或 100g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于促进猪、鸡生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 50g（以有效成分计）。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 5 天。

### 莫能菌素钠预混剂

Monensin Sodium Premix

[有效成分] 莫能菌素钠

[含量规格] 每 1000g 中含莫能菌素 50g 或 100g 或 200g。

[适用动物] 牛、鸡

[作用与用途] 用于鸡球虫病和肉牛促生长。

[用法与用量] 混饲。鸡，每 1000kg 饲料添加 90-110g；肉牛，每头每天 200-360mg。以上均以有效成分计。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；泌乳期的奶牛及马属动物禁用；禁止与泰妙菌素、竹桃霉素并用；搅拌配料时禁止与人的皮

肤、眼睛接触；休药期 5 天。

[商品名称] 瘤胃素、欲可胖

### 杆菌肽锌预混剂

Bacitracin Zinc Premix

[有效成分] 杆菌肽锌

[含量规格] 每 1000g 中含杆菌肽 100g 或 150g。

[适用动物] 牛、猪、禽

[作用与用途] 用于促进畜禽生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，犊牛 10-100g（3 月龄以下）、4-40g（6 月龄以下），猪 4-40g（4 月龄以下），鸡 4-40g（16 周龄以下）。以上均以有效成分计。

[注意] 休药期 0 天。

### 黄霉素预混剂

Flavomycin Premix

[有效成分] 黄霉素

[含量规格] 每 1000g 中含黄霉素 40g 或 80g。

[适用动物] 牛、猪、鸡

[作用与用途] 用于促进畜禽生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，仔猪 10-25g，生长、育肥猪 5g，肉鸡 5g，肉牛每头每天 30-50mg。以上均以有效成分计。

[注意] 休药期 0 天。

[商品名称] 富乐旺

### 维吉尼亚霉素预混剂

Virginiamycin Premix

[有效成分] 维吉尼亚霉素

[含量规格] 每 1000g 中含维吉尼亚霉素 500g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于促进畜禽生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品，猪 20-50g，鸡 10-40g。

[注意] 休药期 1 天。

[商品名称] 速大肥

### 喹乙醇预混剂

Olaquinox Premix

[有效成分] 喹乙醇

[含量规格] 每 1000g 中含喹乙醇 50g。

[适用动物] 猪

[作用与用途] 用于猪促生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 1000g-2000g。

[注意] 禁用于禽；禁用于体重超过 35 kg 的猪；休药期 35 天。

### 那西肽预混剂

Nosiheptide Premix

[有效成分] 那西肽

[含量规格] 每 1000g 中含那西肽 2.5g。  
[适用动物] 鸡  
[作用与用途] 用于鸡促生长。  
[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 1000g。  
[注意] 休药期 3 天

### 阿美拉霉素预混剂

Avilamycin Premix

[有效成分] 阿美拉霉素  
[含量规格] 每 1000g 中含阿美拉霉素 100g。  
[适用动物] 猪、鸡  
[作用与用途] 用于猪和肉鸡的促生长。  
[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品，猪 200-400g（4 月龄以内），100-200g（4-6 月龄），肉鸡 50-100g。  
[注意] 休药期 0 天。  
[商品名称] 效美素

### 盐霉素钠预混剂

Salinomycin Sodium Premix

[有效成分] 盐霉素钠  
[含量规格] 每 1000g 中含盐霉素 50 g 或 60g 或 100g 或 120g 或 450g 或 500g。  
[适用动物] 牛、猪、鸡  
[作用与用途] 用于鸡球虫病和促进畜禽生长。  
[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，鸡 50-70g；猪 25-75g；牛 10-30g。以上均以有效成分计。  
[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；马属动物禁用；禁止与泰妙菌素、竹桃霉素并用；休药期 5 天。  
[商品名称] 优素精、赛可喜

### 硫酸粘杆菌素预混剂

Colistin Sulfate Premix

[有效成分] 硫酸粘杆菌素  
[含量规格] 每 1000g 中含粘杆菌素 20g 或 40g 或 100g。  
[适用动物] 牛、猪、鸡  
[作用与用途] 用于革兰氏阴性杆菌引起的肠道感染，并有一定的促生长作用。  
[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，犊牛 5-40g，仔猪 2-20g，鸡 2-20g。以上均以有效成分计。  
[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 7 天。  
[商品名称] 抗敌素

### 牛至油预混剂

Oregano Oil Premix

[有效成分] 5-甲基-2-异丙基苯酚和 2-甲基-5-异丙基苯酚  
[含量规格] 每 1000g 中含 5-甲基-2-异丙基苯酚和 2-甲基-5-异丙基苯酚 25g。  
[适用动物] 猪、鸡  
[作用与用途] 用于预防及治疗猪、鸡大肠杆菌、沙门氏菌所致的下痢，促进畜禽生长。  
[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品，用于预防疾病，猪 500-700g，鸡 450g；用于治疗疾病，猪 1000-1300g，鸡 900g，连用 7 天；用于促生长，猪、鸡 50-500g。  
[商品名称] 诺必达

### 杆菌肽锌、硫酸粘杆菌素预混剂

Bacitracin Zinc and Colistin Sulfate Premix

[有效成分] 杆菌肽锌和硫酸粘杆菌素

[含量规格] 每 1000g 中含杆菌肽 50g 和粘杆菌素 10g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于革兰氏阳性菌和阴性菌感染，并具有一定的促生长作用。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，猪 2-40g（2 月龄以下）、2-20g（4 月龄以下），鸡 2-20g。以上均以有效成分计。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 7 天。

[商品名称] 万能肥素

### 土霉素钙

Oxytetracycline Calcium

[有效成分] 土霉素钙

[含量规格] 每 1000g 中含土霉素 50g 或 100g 或 200g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 抗生素类药。对革兰氏阳性菌和阴性菌均有抑制作用，用于促进猪、鸡生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，猪 10-50g（4 月龄以内），鸡 10-50g（10 周龄以内）。以上均以有效成分计。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；添加于低钙饲料（饲料含钙量 0.18-0.55%）时，连续用药不超过 5 天。

### 吉他霉素预混剂

Kitasamycin Premix

[有效成分] 吉他霉素

[含量规格] 每 1000g 中含吉他霉素 22g 或 110g 或 550g 或 950g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于防治慢性呼吸系统疾病，也用于促进畜禽生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，用于促生长，猪 5-55g，鸡 5-11g；用于防治疾病，猪 80-330g，鸡 100-330g，连用 5-7 天。以上均以有效成分计。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 7 天。

### 金霉素（饲料级）预混剂

Chlortetracycline (Feed Grade) Premix

[有效成分] 金霉素

[含量规格] 每 1000g 中含金霉素 100g 或 150g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 对革兰氏阳性菌和阴性菌均有抑制作用，用于促进猪、鸡生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，猪 25-75g（4 月龄以内），鸡 20-50g（10 周龄以内）。以上均以有效成分计。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 7 天。

### 恩拉霉素预混剂

Enramycin Premix

[有效成分] 恩拉霉素

[含量规格] 每 1000g 中含恩拉霉素 40g 或 80g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 对革兰氏阳性菌有抑制作用，用于促进猪、鸡生长。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，猪 2.5-20g，鸡 1-10g。以上均以有效成分计。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期 7 天。

### 磺胺喹噁啉、二甲氧苄啶预混剂

Sulfaquinoxaline and Diaveridine Premix

[有效成分] 磺胺喹噁啉和二甲氧苄啶

[含量规格] 每 1000g 中含磺胺喹噁啉 200g 和二甲氧苄啶 40g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于禽球虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g。

[注意] 连续用药不得超过 5 天；蛋鸡产蛋期禁用；休药期 10 天。

### 越霉素 A 预混剂

Destomycin A Premix

[有效成分] 越霉素 A

[含量规格] 每 1000g 中含越霉素 A 20g 或 50g 或 500g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 主用于猪蛔虫病、鞭虫病及鸡蛔虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加 5-10g（以有效成分计），连用 8 周。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期，猪 15 天，鸡 3 天。

[商品名称] 得利肥素

### 潮霉素 B 预混剂

Hygromycin B Premix

[有效成分] 潮霉素 B

[含量规格] 每 1000g 中含潮霉素 B 17.6g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于驱除猪蛔虫、鞭虫及鸡蛔虫。

[用法与用量] 混饲。每 1000g 饲料添加，猪 10-13g，育成猪连用 8 周，母猪产前 8 周至分娩，鸡 8-12g，连用 8 周。

以上均以有效成分计。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；避免与人皮肤、眼睛接触；休药期猪 15 天，鸡 3 天。

[商品名称] 效高素

### 地美硝唑预混剂

Dimetridazole Premix

[有效成分] 地美硝唑

[含量规格] 每 1000g 中含地美硝唑 200g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于猪密螺旋体性痢疾和禽组织滴虫病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品，猪 1000-2500g，鸡 400-2500g。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；鸡连续用药不得超过 10 天；休药期猪 3 天，鸡 3 天。

### 磷酸泰乐菌素预混剂

Tylosin Phosphate Premix

[有效成分] 磷酸泰乐菌素

[含量规格] 每 1000g 中含泰乐菌素 20g 或 88g 或 100g 或 220g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 主用于畜禽细菌及支原体感染。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，猪 10-100g，鸡 4-50g。以上均以有效成分计，连用 5-7 天。

[注意] 休药期 5 天。

### 硫酸安普霉素预混剂

Apramycin Sulfate Premix

[有效成分] 硫酸安普霉素

[含量规格] 每 1000g 中含安普霉素 20g 或 30g 或 100g 或 165g。

[适用动物] 猪

[作用与用途] 用于畜禽肠道革兰氏阴性菌感染。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加 80-100g(以有效成分计)，连用 7 天。

[注意] 接触本品时，需戴手套及防尘面罩；休药期 21 天。

[商品名称] 安百痢

### 盐酸林可霉素预混剂

Lincomycin Hydrochloride Premix

[有效成分] 盐酸林可霉素

[含量规格] 每 1000g 中含林可霉素 8.8g 或 110g。

[适用动物] 猪、禽

[作用与用途] 用于畜禽革兰氏阳性菌感染，也可用于猪密螺旋体、弓形虫感染。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加，猪 44-77g，鸡 2.2-4.4g，连用 7-21 天。以上均以有效成分计。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；禁止家兔、马或反刍动物接近含有林可霉素的饲料；休药期 5 天。

[商品名称] 可肥素

### 赛地卡霉素预混剂

Sedecamycin Premix

[有效成分] 赛地卡霉素

[含量规格] 每 1000g 中含赛地卡霉素 10g 或 20g 或 50g。

[适用动物] 猪

[作用与用途] 主用于治疗猪密螺旋体引起的血痢。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加 75g（以有效成分计），连用 15 天。

[注意] 休药期 1 天。

[商品名称] 克泻痢宁

### 伊维菌素预混剂

Ivermectin Premix

[有效成分] 伊维菌素

[含量规格] 每 1000g 中含伊维菌素 6g。

[适用动物] 猪

[作用与用途] 对线虫、昆虫和螨均有驱杀活性，主要用于治疗猪的胃肠道线虫病和疥螨病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加 330g，连用 7 天。

[注意] 休药期 5 天。

### 呋喃苯烯酸钠粉

Nifurstyrenate Sodium Powder

[有效成分] 呋喃苯烯酸钠

[含量规格] 每 1000g 中含呋喃苯烯酸钠 100g。

[适用动物] 鱼

[作用与用途] 用于鲑目鱼类的类结节菌及鲟目鱼的滑行细菌的感染。

[用法与用量] 混饲。每 1kg 体重，鲑目鱼类每日用本品 0.5g，连用 3-10 天。

[注意] 休药期 2 天。

[商品名称] 尼福康

### 延胡索酸泰妙菌素预混剂

Tiamulin Fumarate Premix

[有效成分] 延胡索酸泰妙菌素

[含量规格] 每 1000g 中含泰妙菌素 100g 或 800g。

[适用动物] 猪

[作用与用途] 用于猪支原体肺炎和嗜血杆菌胸膜性肺炎，也可用于猪密螺旋体引起的痢疾。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加 40-100g (以有效成分计)，连用 5-10 天。

[注意] 避免接触眼及皮肤；禁止与莫能菌素、盐霉素等聚醚类抗生素混合使用；休药期 5 天。

[商品名称] 枝原净

### 环丙氨嗪预混剂

Cyromazine Premix

[有效成分] 环丙氨嗪

[含量规格] 每 1000g 中含环丙氨嗪 10g。

[适用动物] 鸡

[作用与用途] 用于控制动物厩舍内蝇幼虫的繁殖。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 500g，连用 4-6 周。

[注意] 避免儿童接触。

[商品名称] 蝇得净

### 氟苯咪唑预混剂

Flubendazole Premix

[有效成分] 氟苯咪唑

[含量规格] 每 1000g 中含氟苯咪唑 50g 或 500g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于驱除畜禽胃肠道线虫及绦虫。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料，猪 30g，连用 5-10 天；鸡 30g，连用 4-7 天。以上均以有效成分计。

[注意] 休药期 14 天。

[商品名称] 弗苯诺

### 复方磺胺嘧啶预混剂

Compound Sulfadiazine Premix

[有效成分] 磺胺嘧啶和甲氧苄啶

[含量规格] 每 1000g 中含磺胺嘧啶 125g 和甲氧苄啶 25g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于链球菌、葡萄球菌、肺炎球菌、巴氏杆菌、大肠杆菌和李氏杆菌等感染。

[用法与用量] 混饲。每 1kg 体重，每日添加本品，猪 0.1-0.2g，连用 5 天；鸡 0.17-0.2g，连用 10 天。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期猪 5 天，鸡 1 天。

[商品名称] 立可灵

### **盐酸林可霉素、硫酸大观霉素预混剂**

Lincomycin Hydrochloride and Spectinomycin Sulfate Premix

[有效成分] 盐酸林可霉素和硫酸大观霉素

[含量规格] 每 1000g 中含林可霉素 22g 和大观霉素 22g。

[适用动物] 猪

[作用与用途] 用于防治猪赤痢、沙门氏菌病、大肠杆菌肠炎及支原体肺炎。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 1000g，连用 7-21 天。

[注意] 休药期 5 天。

[商品名称] 利高霉素

### **硫酸新霉素预混剂**

Neomycin Sulfate Premix

[有效成分] 硫酸新霉素

[含量规格] 每 1000g 中含新霉素 154g。

[适用动物] 猪、鸡

[作用与用途] 用于治疗畜禽的葡萄球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、变形杆菌感染引起的肠炎。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品，猪、鸡 500-1000g，连用 3-5 天。

[注意] 蛋鸡产蛋期禁用；休药期猪 3 天，鸡 5 天。

[商品名称] 新肥素

### **磷酸替米考星预混剂**

Tilmicosin Phosphate Premix

[有效成分] 磷酸替米考星

[含量规格] 每 1000g 中含替米考星 200g。

[适用动物] 猪

[作用与用途] 主用于治疗猪胸膜肺炎放线杆菌、巴氏杆菌及支原体引起的感染。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 2000g，连用 15 天。

[注意] 休药期 14 天。

### **磷酸泰乐菌素、磺胺二甲嘧啶预混剂**

Tylosin Phosphate and Sulfamethazine Premix

[有效成分] 磷酸泰乐菌素和磺胺二甲嘧啶

[含量规格] 每 1000g 中含泰乐菌素 22g 和磺胺二甲嘧啶 22g、泰乐菌素 88 克和磺胺二甲嘧啶 88 克或泰乐菌素 100 克和磺胺二甲嘧啶 100g。

[适用动物] 猪

[作用与用途] 用于预防猪痢疾，用于畜禽细菌及支原体感染。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 200g(100g 泰乐菌素+100g 磺胺二甲嘧啶)，连用 5-7 天。

[注意] 休药期 15 天。

[商品名称] 泰农强

### **甲砒霉素散**

Thiamphenicol Powder

[有效成分] 甲砒霉素

[含量规格] 每 1000g 中含甲砒霉素 50g。

[适用动物] 鱼

[作用与用途] 用于治疗鱼类由嗜水气单孢菌、肠炎菌等引起的细菌性败血症、肠炎、赤皮病等。

[用法与用量] 混饲。每 150kg 鱼加本品 1000g，连用 3-4 天，预防量减半。

### 诺氟沙星、盐酸小檗碱预混剂

Norfloxacin and Berberine Hydrochloride Premix

[有效成分] 诺氟沙星和盐酸小檗碱

[含量规格] 每 1000g 中含诺氟沙星 90g 和盐酸小檗碱 20g（鳊用）或诺氟沙星 25g 和盐酸小檗碱 8g（鳖用）。

[适用动物] 鳊鱼、鳖

[作用与用途] 用于鳊鱼嗜水气单孢菌与柱状杆菌引起的赤鳃病与烂鳃病；用于鳖红脖子病，烂皮病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品，鳊鱼 15kg，鳖 15kg，连用 3 天。

### 维生素 C 磷酸酯镁、盐酸环丙沙星预混剂

Magnesium Ascorbic Acid Phosphate and Ciprofloxacin

Hydrochloride Premix

[有效成分] 维生素 C 磷酸酯镁和盐酸环丙沙星

[含量规格] 每 1000g 中含维生素 C 磷酸酯镁 100g 和盐酸环丙沙星 10g。

[适用动物] 鳖

[作用与用途] 用于预防细菌性疾病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 5kg，连用 3-5 天。

### 盐酸环丙沙星、盐酸小檗碱预混剂

Ciprofloxacin Hydrochloride and Berberine Hydrochloride Premix

[有效成分] 盐酸环丙沙星和盐酸小檗碱

[含量规格] 每 1000g 中含盐酸环丙沙星 100g 和盐酸小檗碱 40g。

[适用动物] 鳊鱼

[作用与用途] 用于治疗鳊鱼细菌性疾病。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加本品 15kg，连用 3-4 天。

### 噁喹酸散

Oxolinic Acid Powder

[有效成分] 噁喹酸

[含量规格] 每 1000g 中含噁喹酸 50g 或 100g。

[适用动物] 鱼、虾

[作用与用途] 用于治疗鱼、虾的细菌性疾病。

[用法与用量] 混饲。每 1kg 体重，每日添加按有效成分计，

鱼类：鲈鱼目鱼类，类结节病 0.01-0.3g，连用 5-7 天。

鲱鱼目鱼类，疮病 0.05-0.1g，连用 5-7 天。

弧菌病 0.05-0.2g，连用 3-5 天。

香鱼，弧菌病 0.05-0.2g，连用 3-7 天。

鲤鱼目类，肠炎病 0.05-0.1g，连用 5-7 天。

鳊鱼类，赤鳍病 0.05-0.2g，连用 4-6 天；赤点病 0.01-0.05g，连用 3-5 天；溃疡病 0.2g，连用 5 天。

虾类：对虾，弧菌病 0.06-0.6g，连用 5 天。

[注意] 休药期香鱼 21 天，虹鳟鱼 21 天，鳊鱼 25 天，鲤鱼 21 天，其它鱼类 16 天；鳊鱼使用本品时，食用前 25 日间，鳊鱼饲育水日交换率平均应在 50%以上。

[商品名称] 旺速乐

## 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉

Sulfaclozine Sodium Soluble Powder

[有效成分] 磺胺氯吡嗪钠

[含量规格] 每 1000g 中含磺胺氯吡嗪钠 300g。

[适用动物] 肉鸡、火鸡、兔

[作用与用途] 用于鸡、兔球虫病（盲肠球虫）。

[用法与用量] 混饲。每 1000kg 饲料添加 肉鸡、火鸡 600mg 连用 3 天，兔 600 mg 连用 15 天（以有效成分计）

[注意] 休药期火鸡 4 天，肉鸡 1 天，产蛋期禁用。

[商品名称] 三字球虫粉

### 附件 2：饲料药物添加剂附录一

序号	名 称
1	二硝托胺预混剂
2	马杜霉素铵预混剂
3	尼卡巴嗪预混剂
4	尼卡巴嗪、乙氧酰胺苯甲酯预混剂
5	甲基盐霉素、尼卡巴嗪预混剂
6	甲基盐霉素、预混剂
7	拉沙诺西钠预混剂
8	氢溴酸常山酮预混剂
9	盐酸氯苯胍预混剂
10	盐酸氨丙啉、乙氧酰胺苯甲酯预混剂
11	盐酸氨丙啉、乙氧酰胺苯甲酯、磺胺喹噁啉预混剂
12	氯羟吡啶预混剂
13	海南霉素钠预混剂
14	赛杜霉素钠预混剂
15	地克珠利预混剂
16	复方硝基酚钠预混剂
17	氨苯胂酸预混剂
18	洛克沙胂预混剂
19	莫能菌素钠预混剂
20	杆菌肽锌预混剂
21	黄霉素预混剂
22	维吉尼亚霉素预混剂
23	喹乙醇预混剂
24	那西肽预混剂
25	阿美拉霉素预混剂
26	盐霉素钠预混剂
27	硫酸粘杆菌素预混剂
28	牛至油预混剂
29	杆菌肽锌、硫酸粘杆菌素预混剂
30	吉它霉素预混剂
31	土霉素钙预混剂
32	金霉素预混剂
33	恩拉霉素预混剂

附件 3：饲料药物添加剂附录二

1	磺胺喹噁啉、二甲氧苄啶预混剂
2	越霉素 A 预混剂
3	潮霉素 B 预混剂
4	地美硝唑预混剂
5	磷酸泰乐菌素预混剂
6	硫酸安普霉素预混剂
7	盐酸林可霉素预混剂
8	赛地卡霉素预混剂
9	伊维菌素预混剂
10	呋喃苯烯酸钠粉
11	延胡索酸泰妙菌素预混剂
12	环丙氨嗪预混剂
13	氟苯咪唑预混剂
14	复方磺胺嘧啶预混剂
15	盐酸林可霉素、硫酸大观霉素预混剂
16	硫酸新霉素预混剂
17	磷酸替米考星预混剂
18	磷酸泰乐菌素、磺胺二甲嘧啶预混剂
19	甲矾霉素散
20	诺氟沙星、盐酸小檗碱预混剂
21	维生素 C 磷酸酯镁、盐酸环丙沙星预混剂
22	盐酸环丙沙星、盐酸小檗碱预混剂
23	喹酸散
24	磺胺氯吡嗪钠可溶性粉